


Magnesiocard®

Für die Magnesium-Therapie nach Bedarf.¹

- Organisches Magnesiumsalz mit hoher Resorptionsquote¹
- Kombinierbar mit Eisen-Präparaten²
- Breites Spektrum an Dosisstärken¹



Magnesiocard® (orale Formen)

Z: Magnesium aspartatis hydrochloridum trihydricum. I: Magnesiummangel, Herzrhythmusstörungen, erhöhter Bedarf im Hochleistungssport und während Schwangerschaft, bei Eklampsie und Präeklampsie, tetanischem Syndrom, bei Wadenkrämpfen, Muskelzuckungen, restless legs. D: 4.5 mg Magnesium (= 0.185 mmol) bis 9 mg Magnesium (= 0.37 mmol) pro kg Körpergewicht / 10 - 20 mmol Magnesium täglich, entsprechend der Darreichungsform (Granulat, Brausetabletten, Filmtabletten), aufgeteilt in 1-3 orale Einzeldosen. KI: Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels. VM: Eingeschränkte Nierenfunktion. Bei Niereninsuffizienz ist eine Überwachung des Serum-Magnesium-Spiegels unerlässlich. Magnesiocard 7.5 mmol nicht bei Phenylketonurie. IA: Tetracycline und Magnesiocard sollten 3-4 Stunden versetzt genommen werden (gegenseitige Resorptionsbeeinträchtigung). Tendenz zur Hypercalcämie bei gleichzeitiger Gabe von Magnesium und Cholecalciferol. S/S: Kann angewendet werden. UW: Gelegentlich: Gastrointestinale Beschwerden. P: Filmtabletten (2.5 mmol) 50, 100; Granulat (5 mmol) Citron und Granulat (5 mmol) Orange 20*, 50*; Brausetabletten (7.5 mmol) 20*, 60*; Granulat (10 mmol) Grapefruit und Granulat (10 mmol) Orange 20*, 50*. Kat. B. Ausführliche Angaben siehe www.swissmedicinfo.ch. *kassenzulässig V030820

Referenzen: 1: www.swissmedicinfo.ch, abgerufen am 11.01.2021 2: Disch G et al. Therapeutic availability of iron administered orally as the ferrous gluconate together with Magnesium-L-Aspartate Hydrochloride. *Arzneim.-Forsch./Drug Res.* 1996; 46(I) Nr. 3: 302-306.

BioMed® Biomed AG, Überlandstrasse 199, CH-8600 Dübendorf © Biomed AG, 01/2021. All rights reserved.