


NEU
DHEA



Intrarosa®
Prasteron 6,5mg
Vaginalzäpfchen



SIE HAT IHRE FREUDE WIEDERGEWONNEN.
UND IHRE PATIENTINNEN?



Prasteron
= DHEA



Verbesserung der
sexuellen Funktion¹



Keine Exposition des Körpers
mit aktiven Hormonen²


Lokale Behandlung vulvovaginaler Atrophie bei postmenopausalen Frauen

Zusamm.: Prasteron 6,5 mg, Hartfett. **Ind.:** Lokale Behandlung vulvovaginaler Atrophie bei postmenopausalen Frauen. **Dos.:** 1 Vaginalzäpfchen täglich zur Schlafenszeit. **KI:** bekannter oder vermuteter Brustkrebs (oder Vorgeschichte); östrogenabhängige Malignome; endometriale Hyperplasie; genitale Blutungen; Vorgeschichte venöser oder arterieller thromboembolischer Ereignisse; thrombophile Störungen; akute Lebererkrankung (oder Vorgeschichte); Porphyrie; Schwangerschaft; Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder Träger. **V:** Gründe für den Abbruch: Kopfschmerzen, erhöhter Blutdruck, Gelbsucht oder Verschlechterung der Leberfunktion, Schwangerschaft. Situationen, die eine verstärkte Überwachung erfordern: Risikofaktoren für östrogenabhängige Tumore, Anamnese von endometrialer Hyperplasie, Gebärmutterfibromen oder Endometriose, thromboembolische Risikofaktoren, Migräne oder Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus mit oder ohne vaskuläre Komplikationen, Lebererkrankungen, biliäre Lithiasis, systemischer Lupus erythematodes, Asthma, Epilepsie, Otosklerose, Flüssigkeitsretention, Hypertriglyceridämie. Die mit der HRT verbundenen Risiken gelten in geringerem Maße für Intrarosa (bei längerer Anwendung des Produkts zu berücksichtigen). **IA:** Substanzen mit induzierender Wirkung auf drogenmetabolisierende Enzyme, insbesondere Cytochrom P450. **UW:** Vaginalausfluss, anomale Ergebnisse im PAP-Abstrich, Gewichtsschwankungen. **P:** Packungen mit 28 Vaginalzäpfchen und 6 Applikatoren [B]. Labatec-Pharma S.A., 1217 Meyrin (Genf). Weitere Arzneimittel-Informationen finden Sie unter: www.swissmedicinfo.ch.

DHEA: Dehydroepiandrosteron

1. Signifikante Verbesserung aller Parameter der sexuellen Funktion nach 12 Wochen mit FSFI (Female Sexual Function Index), bei postmenopausalen Frauen mit vulvovaginaler Atrophie. Labrie F. et al. Intravaginal Prasterone and Sexual Function. J Sex Med. 2015 Dec;12(12):2401-12.

2. Ke Y et al. Serum steroids remain within the same normal postmenopausal values during 12-month intravaginal 0.50% DHEA. Horm Mol Biol Clin Investig. 2015 Dec;24(3):117-29.

 LABATEC

INT01DE0420